

Problemas – Tema 1

Solución a problemas de Repaso de Matemáticas I - Hoja 14 - Problemas 3, 4, 5

Hoja 14. Problema 3

Resuelto por Marta Quesada Tofé (octubre 2014)

3. Calcular el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt[3]{x}}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x^{\frac{1}{3}}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

$$L' \text{ Hopital} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3}{x \cdot x^{-\frac{2}{3}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^{\frac{1}{3}}} = 0$$

Hoja 14. Problema 4

Resuelto por Ignacio Roldán (septiembre 2014)

4. Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\tan x}$.

Primero calculo el tipo de indeterminación que es, evaluando el límite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\tan x} = \frac{1 - \cos 0}{\tan 0} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminación}$$

Estamos en condición de aplicar L'Hôpital al tener funciones continuas y derivables (al menos en un entorno alrededor de $x=0$), e indeterminación 0/0. Derivamos numerador y denominador por separado.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot \cos^2 x = 0$$

Hoja 14. Problema 5

Resuelto por Mónica Jiménez Almenara (septiembre 2014)

5. Calcular la base y la altura del triángulo isósceles de perímetro 8 y área máxima.

El triángulo isósceles tiene base x , y los otros dos lados de longitud y . Su perímetro es 8, según el enunciado. Por lo tanto:

$$8 = 2y + x \rightarrow y = \frac{8 - x}{2}$$

Si el triángulo isósceles lo dividimos, por la mitad, en dos triángulos rectángulos semejantes, de catetos h (altura) y $\frac{x}{2}$ (mitad de la base), e hipotenusa y (uno de los dos lados iguales del triángulo), se cumple por Pitágoras:

$$h = \sqrt{y^2 - \frac{x^2}{4}}$$

Sustituyendo el valor de y razonado anteriormente:

$$h = \frac{\sqrt{64 - 16x + x^2} - x^2}{4}$$

$$h = \sqrt{16 - 4x}$$

El área de un triángulo es $\rightarrow A = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{x \cdot h}{2} \rightarrow$ sustituyendo el valor de h :

$$A = \frac{x \sqrt{16 - 4x}}{2} = \sqrt{4x^2 - x^3} \rightarrow \text{Dom}(A) = [0, 4]$$

Y esta es la función a maximizar, que solo depende de la variable x . Derivamos e igualamos a cero.

$$A' = \frac{8x - 3x^2}{2\sqrt{4x^2 - x^3}} = 0 \rightarrow x = 0, \quad x = \frac{8}{3}$$

La solución con sentido físico es $\frac{8}{3}$, ya que no vamos a tener un triángulo de lados nulos. Debemos comprobar que es un máximo, viendo el crecimiento y decrecimiento a izquierda y derecha de este punto crítico (recordando el dominio de la función área $Dom(A) = [0, 4]$).

$$0 < x < \frac{8}{3} \rightarrow A'(x) > 0 \Rightarrow A \uparrow$$

$$\frac{8}{3} < x < 4 \rightarrow A'(x) < 0 \Rightarrow A \downarrow$$

Confirmamos la existencia de máximo relativo en $x = \frac{8}{3}$, dando lugar a una altura

$$h = \sqrt{16 - 4\left(\frac{8}{3}\right)} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ y a un área máxima de } A_{max} = \frac{x \cdot h}{2} = \frac{32\sqrt{3}}{9} u^2 .$$